

検査項目	
COVID19-N抗体陽性	既感染
COVID19-S抗体陽性	既感染+ワクチン効果
CD8(キラーT細胞)割合の低下	癌免疫の低下
CD56(ナチュラルキラー細胞)割合低下	癌免疫・感染防御免疫低下
Dダイマー高値	梗塞、血栓、動脈解離のリスク

使用薬剤	薬理学的効果
ヘモナーゼ(プロメライン)	スパイク蛋白分解
セファランチン	スパイク蛋白吸着、CD8細胞増加
マグネシウム製剤	CD8活性作用
十全大補湯	CD8細胞増加
グルタチオン	NK細胞機能に必要
補中益気湯	NK細胞機能に細胞活性化
プラビックス(少量)	抗血小板作用

具体的症状別

脱毛
皮膚炎
頭痛
ME/CSF(筋痛性脳脊髄炎・慢性疲労症候群)

使用薬剤	薬理学的効果
セファランチン	スパイク蛋白吸着、CD8細胞増加
ハイチオール	解毒
セレスタミン	ステロイド
グルタチオン	解毒
釣藤散	
ヘモナーゼ(プロメライン)	スパイク蛋白分解
ビタミンD	免疫賦活作用

その他、可能であれば、ビタミンD、ビタミンCは併用が望ましい。