

検査項目	
COVID19-N抗体陽性	既感染
COVID19-S抗体陽性	既感染+ワクチン効果
CD8(キラーT細胞)割合の低下	癌免疫の低下
CD56(ナチュラルキラー細胞)割合低下	癌免疫・感染防御免疫低下
Dダイマー高値	梗塞、血栓、動脈解離のリスク

具体的症状別

脱毛
皮膚炎
頭痛
ME/CSF(筋痛性脳脊髄炎・慢性疲労症候群)

その他、可能であれば、ビタミンD、ビタミンCは併用が望ましい。

使用薬剤	薬理学的効果
ヘモナーゼ(ブロメライン)	スパイク蛋白分解
セファランチン	スパイク蛋白吸着、CD8細胞増加
マグネシウム製剤	CD8活性作用
十全大補湯	CD8細胞増加
黄連解毒湯	ベルベリンによる抗癌作用とP53活性化
グルタチオン	NK細胞機能に必要
補中益気湯	NK細胞機能に細胞活性化
プラビックス(少量)	抗血小板作用
セファランチン	スパイク蛋白吸着、CD8細胞増加
ハイチオール	解毒
セレストミン	ステロイド
グルタチオン	解毒
釣藤散	
ヘモナーゼ(ブロメライン)	スパイク蛋白分解
ビタミンD	免疫賦活作用